

Министерство Образования и Науки
Экзамен по математике на соискание звания бакалавра, июнь, 1999
Гуманитарный профиль
II Вариант

Время решения - 180 минут

1. Пусть $f : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{2^x}{2^{2x} - 1}$. Вычислить $f(\log_2 3)$.

Решение. Используя основное логарифмическое тождество ($a^{\log_a b} = b$, $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$), получим

$$f(\log_2 3) = \frac{2^{\log_2 3}}{2^{2 \log_2 3} - 1} = \frac{3}{(2^{\log_2 3})^2 - 1} = \frac{3}{3^2 - 1} = \frac{3}{8}.$$

2. Написать уравнение второго порядка с действительными корнями, произведение которых равнялось бы четырем.

Решение. Используя обратную теорему Виета, например, для $x_1 = 1$ и $x_2 = 4$ (тогда $x_1 \cdot x_2 = 4$, $x_1 + x_2 = 5$), получим квадратное уравнение

$$x^2 - 5x + 4 = 0.$$

3. Пусть $z = \frac{1-i}{2+i}$. Определить, при каких значениях a и b справедливо равенство $\sqrt{5} \cdot z + a + bi = 5 - 3i$.

Решение. Так как

$$z = \frac{1-i}{2+i} = \frac{(1-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{1-3i}{2^2+1^2} = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i,$$

то равенство принимает вид

$$\sqrt{5} \left(\frac{1}{5} - \frac{3}{5}i \right) + a + bi = 5 - 3i$$

или

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}} + a \right) + \left(b - \frac{3}{\sqrt{5}} \right) i = 5 - 3i,$$

откуда, используя определение равенства двух комплексных чисел ($z_1 = z_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2$ и $\operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$), получим систему

$$\begin{cases} a + \frac{1}{\sqrt{5}} = 5, \\ b - \frac{3}{\sqrt{5}} = -3, \end{cases}$$

решение которой $a = 5 - \frac{1}{\sqrt{5}}$, $b = \frac{3}{\sqrt{5}} - 3$.

4. Пусть дана функция $f(x) = 1 - \cos x$. Вычислить значение выражения $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Решение. Используя формулы приведения $\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm x\right) = \mp \sin x$, получим

$$f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1 - \sin x + 1 + \sin x = 2.$$

5. При каких действительных значениях параметра m многочлен $2x^3 - x^2 + mx - 2$ делится на $x - 2$.


Решение. Поскольку

$$f(2) = 2 \cdot 2^3 - 2^2 + m \cdot 2 - 2 = 10 + 2m,$$

решая линейное уравнение $10 + 2m = 0$, получим $m = -5$.

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной графиками функций $f(x) = -x^2 - 4x$ и $g(x) = 4 + x$.

Решение.



Искомая площадь определяется, используя формулу

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx,$$

где a и b - пределы интегрирования.

Для определения a и b решим уравнение $f(x) = g(x)$, то есть,

$$-x^2 - 4x = 4 + x$$

или

$$x^2 + 5x + 4 = 0,$$

откуда, учитывая, что $a < b$, получим $x_1 = a = -4$, $x_2 = b = -1$.

Таким образом,

$$\begin{aligned} S &= \int_{-4}^{-1} (-x^2 - 4x - x - 4) dx = \int_{-4}^{-1} (-x^2 - 5x - 4) dx = - \left(\frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 4x \right) \Big|_{-4}^{-1} = \\ &= - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4 + \frac{64}{3} - 40 + 16 \right) = 4,5 (\text{кв.ед.}). \end{aligned}$$

7. Пусть функция $f : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$, ($\mathbf{D} \subset \mathbf{R}$), $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 1}$. Решить уравнение $3f(x) = 2f'(x)$.

Решение. Используя правило нахождения производной сложной функции, находим $f'(x)$:

$$f'(x) = \left(\sqrt{x^2 - 3x + 1} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 3x + 1}} \cdot (x^2 - 3x + 1)' = \frac{2x - 3}{2\sqrt{x^2 - 3x + 1}},$$

и уравнение примет вид

$$3\sqrt{x^2 - 3x + 1} = \frac{2x - 3}{\sqrt{x^2 - 3x + 1}},$$

или

$$3(x^2 - 3x + 1) = 2x - 3,$$

откуда следует квадратное уравнение

$$3x^2 - 11x + 6 = 0,$$

решения которого $x_1 = \frac{2}{3}$ и $x_2 = 3$.

После проверки остается $x = 3$.

8. Решить неравенство $\log_x \frac{x+3}{x-1} > 1$.

Решение. Используя утверждение 3 из **Логарифмические неравенства**, получим совокупность систем

$$\log_x \frac{x+3}{x-1} > 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} x > 1, \\ \frac{x+3}{x-1} > x, \\ x > 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} 0 < x < 1, \\ \frac{x+3}{x-1} < x, \\ \frac{x+3}{x-1} > 0, \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x \in (1; 3), \\ x \in \emptyset, \end{array} \right. \Leftrightarrow x \in (1; 3).$$

Действительно, первая система совокупности (учитывая, что $x > 1$) равносильна системе


$$\left\{ \begin{array}{l} x > 1, \\ x + 3 < x(x - 1) \end{array} \right. \quad \text{или} \quad \left\{ \begin{array}{l} x > 1, \\ x^2 - 2x - 3 < 0, \end{array} \right. \quad \text{откуда } x \in (1; 3).$$

Вторая система не имеет решений, так как при $x \in (0; 1)$ (первое неравенство) имеем $\frac{x+3}{x-1} < 0$, что противоречит последнему неравенству системы.

Таким образом, множеством решений исходного неравенства является $(1; 3)$.

9. Основание пирамиды - квадрат со стороной a . Две боковые грани пирамиды перпендикулярны плоскости основания, а остальные две образуют с ней угол β . Найти площадь боковой поверхности пирамиды.

Решение.



Рассмотрим прямоугольный треугольник SDC ($SD \perp DC$) и, используя метрические соотношения в прямоугольном треугольнике, получим

$$SD = \frac{CD}{\cos \angle DCS} = \frac{a}{\cos \beta},$$

$$SD = CD \operatorname{tg} \angle DCS = a \operatorname{tg} \beta,$$

и, поскольку $\triangle SDC = \triangle SDA$ (SD - общая сторона, $AD = DC$), то

$$S_{\triangle SDA} = S_{\triangle SDC} = \frac{1}{2} SD \cdot DC = \frac{1}{2} a \operatorname{tg} \beta \cdot a = \frac{a^2 \operatorname{tg} \beta}{2}.$$

Так как $SA \perp AB$ ($SC \perp BC$ - следует из теоремы о трех перпендикулярах), имеем

$$S_{\triangle SCB} = \frac{1}{2} SC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{\cos \beta} \cdot a = \frac{a^2}{2 \cos \beta}.$$

Аналогично, $S_{\triangle SAB} = \frac{a^2}{2 \cos \beta}$.

Таким образом, площадь боковой поверхности пирамиды равна

$$S = S_{\triangle SDC} + S_{\triangle SDA} + S_{\triangle SAB} + S_{\triangle SBC} = a^2 \operatorname{tg} \beta + \frac{a^2}{\cos \beta} = a^2 \frac{\sin \beta + 1}{\cos \beta}.$$