

Ecuatii trigonometrice

Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice.

Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatii de tipul

$$\sin x = a, \cos x = a, \operatorname{tg} x = a, \operatorname{ctg} x = a, a \in \mathbf{R}. \quad (1)$$

Cum rezolvarea ecuatiilor trigonometrice se reduce la rezolvarea ecuatiilor de tipul (1) (utilizand diferite transformari), vom aminti afirmatiile de baza referitor la solutiile ecuatiilor (1).

Afirmatia 1. Ecuatia

$$\sin x = a, \quad a \in \mathbf{R}, \quad (2)$$

pentru $|a| > 1$ solutii nu are, iar pentru $|a| \leq 1$ multimea solutiilor ei se contine in formula

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \quad (3)$$

unde $\arcsin a \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ este unghiul, sinusul caruia este egal cu a , iar \mathbf{Z} desemneaza multimea numerelor intregi, sau, echivalent (tinand seama de paritatea lui n), in totalitatea

$$\begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi k, \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi k, \end{cases} \quad k \in \mathbf{Z}. \quad (4)$$

Nota 1. Daca in ecuatia (2) $a \in \{0; -1; 1\}$ solutiile ei (3) se scriu mai simplu, si anume

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

Exemplul 1. Sa se rezolve ecuatii

$$\text{a) } \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \text{b) } \sin x = -\frac{1}{3}; \quad \text{c) } \sin x = \sqrt{11} - 2.$$

Rezolvare. a) Cum $\left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right| \leq 1$, conform (3) solutiile ecuatiei date sunt

$$x = (-1)^n \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

sau tinand seama ca $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, se obtine

$$x = (-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

b) Similar exemplului a) se obtine $x = (-1)^n \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$ sau, tinand seama arcsinus ca functia este o functie impara,

$$x = (-1)^{n+1} \arcsin \frac{1}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

c) Cum $\sqrt{11} - 2 > 1$, rezulta ca ecuatiile date nu au solutii.

Afirmatia 2. Ecuatia

$$\cos x = a \tag{5}$$

pentru $|a| > 1$ nu are solutii, iar pentru $|a| \leq 1$ multimea solutiilor ei se contine in formula

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \tag{6}$$

unde $\arccos a \in [0; \pi]$ este unghiul, cosinusul caruia este egal cu a .

Nota 2. Daca in ecuatiile (5) $a \in \{0; 1; -1\}$ solutiile ei (6) se scriu mai simplu, si anume

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$$

Exemplul 2. Sa se rezolve ecuatiile:

$$\text{a) } \cos x = -\frac{1}{2}; \quad \text{b) } \cos x = \frac{2}{3}; \quad \text{c) } \cos x = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}.$$

Rezolvare. a) Cum $\left|-\frac{1}{2}\right| \leq 1$, conform (6) solutiile ecuatiei date sunt $x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi n$, $n \in \mathbf{N}$, sau tinand seama ca $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, se obtine $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

b) Similar exemplului a) se obtine $x = \pm \arccos \frac{2}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

c) Cum $\frac{\sqrt{3} + 1}{2} > 1$, ecuatiile date nu au solutii.

Afirmatia 3. Ecuatia

$$\operatorname{tg} x = a, \quad a \in \mathbf{R} \tag{7}$$

are solutiile

$$x = \operatorname{arctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \tag{8}$$

unde $\operatorname{arctg} a \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ este unghiul, tangenta caruia este egala cu a .

Afirmatia 4. Ecuatia

$$\operatorname{ctg} x = a, \quad a \in \mathbf{R} \tag{9}$$

are solutiile

$$x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \quad (10)$$

unde $\operatorname{arcctg} a \in (0; \pi)$ este unghiul, cotangenta caruia este egala cu a .

Exemplul 3. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \operatorname{tg} x = 1; \quad \text{b) } \operatorname{tg} x = -2; \quad \text{c) } \operatorname{ctg} x = -1; \quad \text{d) } \operatorname{ctg} x = 3.$$

Rezolvare. a) Conform (8) solutiile ecuatiei date sunt $x = \operatorname{arctg} 1 + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$, sau tinand seama ca $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$, se obtine $x = \frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

b) Similar exemplului precedent se obtine $x = \operatorname{arctg}(-2) + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$, sau tinand seama ca arctangenta este o functie impara, $x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

c) Se tine seama de (10) si se obtine

$$x = \operatorname{arcctg}(-1) + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

sau, cum $\operatorname{arcctg}(-1) = \frac{3\pi}{4}$, $x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

d) Similar exemplului c) se obtine $x = \operatorname{arcctg} 3 + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

Observatie. Ecuatiile

$$\sin f(x) = a, \quad \cos f(x) = a, \quad \operatorname{tg} f(x) = a, \quad \operatorname{ctg} f(x) = a \quad (11)$$

prin intermediul substitutiei $f(x) = t$ se reduc la rezolvarea ecuatiilor (1).

Exemplul 4. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \sin(2x - 1) = 1; \quad \text{b) } \cos(x^2 + 4) = -1; \quad \text{c) } \operatorname{tg} 2x = \sqrt{3}; \quad \text{d) } \operatorname{ctg} x^3 = -2.$$

Rezolvare. a) $\sin(2x - 1) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin t = 1; \\ t = 2x - 1, \end{cases} \Leftrightarrow 2x - 1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n + 1, \quad n \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \pi n + \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbf{Z}.$

b) $\cos(x^2 + 4) = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos t = -1, \\ t = x^2 + 4, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4 = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ \pi + 2\pi n \geq 4, \end{cases} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x^2 = \pi + 2\pi n - 4, \quad n = 1, 2, 3, \dots \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\pi + 2\pi n - 4}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$ (se tine seama ca radicalul de ordin par exista doar din valori nenegative).

c) $\operatorname{tg} 2x = \sqrt{3} \Leftrightarrow 2x = \operatorname{arctg} \sqrt{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow$
 $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}n, \quad n \in \mathbf{Z}.$

d) $\operatorname{ctg} x^3 = -2 \Leftrightarrow x^3 = \operatorname{arcctg}(-2) + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\operatorname{arcctg}(-2) + \pi n}, \quad n \in \mathbf{Z}.$

Ecuatii trigonometrice reductibile la ecuatii de gradul al doilea

Ecuatia

$$a \sin^2 x + b \sin x + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbf{R}, \quad a \neq 0 \quad (12)$$

prin intermediul substitutiei $t = \sin x$, ($|t| \leq 1$) se reduce la ecuatia patrata $at^2 + bt + c = 0$.

Exemplul 5. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } 2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2 = 0; \quad \text{b) } \sin^2 2x - \sin 2x = 0; \quad \text{c) } \sin^2 x - \sin x + 6 = 0.$$

Rezolvare. a) Se noteaza $\sin x = t$ si ecuatia devine

$$2t^2 - 5t + 2 = 0,$$

de unde $t_1 = \frac{1}{2}$ si $t_2 = 2$. Cum $|t| \leq 1$, ramane $t = \frac{1}{2}$ si prin urmare ecuatia initiala este echivalenta cu ecuatia

$$\sin x = \frac{1}{2},$$

solutiile careia sunt (a se vedea (3)) $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

b) Se noteaza $\sin x = t$ si se obtine ecuatia patrata $t^2 - t = 0$ cu solutiile $t_1 = 0$ si $t_2 = 1$. Astfel ecuatia initiala este echivalenta cu totalitatea de ecuatii

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \sin 2x = 1, \end{cases}$$

de unde

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2}n, & n \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi k, & k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

c) Similar exemplurilor precedente se obtine ecuatia patrata $t^2 - t + 6 = 0$, care nu are solutii. Rezulta ca si ecuatia trigonometrica nu are solutii.

Ecuatiile

$$a \cos^2 x + b \cos x + c = 0, \quad (13)$$

$$a \operatorname{tg}^2 x + b \operatorname{tg} x + c = 0, \quad (14)$$

$$a \operatorname{ctg}^2 x + b \operatorname{ctg} x + c = 0, \quad (15)$$

unde $a, b, c \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$ se rezolva similar ecuatiei (12).

In cazul ecuatiei (13) se tine seama ca $t = \cos x$ in modul urmeaza sa nu intreaca unu, iar pentru $t = \operatorname{tg} x$ ($t = \operatorname{ctg} x$) in ecuatia (14) (respectiv (15)) restrictii nu sunt.

Exemplul 6. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } 6 \cos^2 x - 5 \cos x + 1 = 0; \quad \text{b) } \operatorname{tg}^2 2x - 4 \operatorname{tg} 2x + 3 = 0; \quad \text{c) } \operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} - \operatorname{ctg} \frac{x}{2} - 2 = 0.$$

Rezolvare. a) Se noteaza $\cos x = t$ si se obtine ecuatia patrata

$$6t^2 - 5t + 1 = 0$$

cu solutiile $t = \frac{1}{3}$ si $t_2 = \frac{1}{2}$. Cum ambele solutii verifica conditia $|t| \leq 1$ se obtine totalitatea

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{3}, \\ \cos x = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

de unde $x = \pm \arccos \frac{1}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbf{Z}$, $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbf{Z}$.

b) Se noteaza $\operatorname{tg} 2x = t$ si se obtine ecuatia patrata

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

cu solutiile $t_1 = 1$ si $t_2 = 3$. Prin urmare

$$\begin{cases} \operatorname{tg} 2x = 1, \\ \operatorname{tg} 2x = 3, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ 2x = \operatorname{arctg} 3 + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \end{cases}$$

de unde $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}n$, $x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi}{2}k$, $n, k \in \mathbf{Z}$.

c) Se rezolva similar exemplului precedent si se obtine $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$, $x = 2 \operatorname{arctg} 2 + 2\pi k$, $n, k \in \mathbf{Z}$.

Ecuatia

$$a \cos^2 x + b \sin x + c = 0, \quad (16)$$

utilizand identitatea trigonometrica de baza $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, se reduce la rezolvarea unei ecuatii de tipul (12):

$$a(1 - \sin^2 x) + b \sin x + c = 0.$$

Similar, ecuatia

$$a \sin^2 x + b \cos x + c = 0 \quad (17)$$

se reduce la rezolvarea unei ecuatii de tipul (13):

$$a(1 - \cos^2 x) + b \cos x + c = 0.$$

Utilizand formulele

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x, \quad \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

ecuatiile

$$a \cos 2x + b \sin x + c = 0, \quad (18)$$

$$a \cos 2x + b \cos x + c = 0, \quad (19)$$

se reduc la rezolvarea ecuatiilor de tipul (12) si respectiv (13).

Exemplul 7. Sa se rezolve ecuatiile:

$$\text{a) } 2 \sin^2 x + 5 \cos x - 5 = 0; \quad \text{b) } \cos 4x + \sqrt{2} \sin 2x - 1 = 0.$$

Rezolvare. a) Cum $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, ecuatia devine

$$2(1 - \cos^2 x) + 5 \cos x - 5 = 0$$

sau

$$2 \cos^2 x - 5 \cos x + 3 = 0,$$

de unde $\cos x = \frac{3}{2}$ (aceasta ecuatie nu are solutii) sau $\cos x = 1$, cu solutiile $x = 2\pi k$, $k \in \mathbf{Z}$.

b) Cum $\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x$, ecuatia devine

$$-2 \sin^2 2x + \sqrt{2} \sin 2x = 0,$$

sau

$$\sin 2x(\sqrt{2} \sin 2x - 1) = 0,$$

de unde

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \sin 2x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

si $x = \frac{\pi}{2}k$, $x = (-1)^n \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$, $k, n \in \mathbf{Z}$.

Ecuatia

$$a \operatorname{tg} x + b \operatorname{ctg} x + c = 0 \tag{20}$$

tinand seama ca $\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x = 1$ ($x \neq \frac{\pi}{2} \cdot k$, $k \in \mathbf{Z}$) prin intermediul substitutiei $t = \operatorname{tg} x$ (atunci $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{t}$) se reduce la o ecuatie trigonometrica de tipul (14).

Exemplul 8. Sa se rezolve ecuatia:

$$\operatorname{tg} x - 5 \operatorname{tg} \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) = 6 \sin \frac{7\pi}{2}.$$

Rezolvare. Cum $\sin \frac{7\pi}{2} = 1$ si $\operatorname{tg} \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) = -\operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) = -\operatorname{ctg} x$, ecuatia devine

$$\operatorname{tg} x + 5 \operatorname{ctg} x - 6 = 0.$$

Se noteaza $\operatorname{tg} x = t$, atunci $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{t}$ ($x \neq \frac{\pi}{2}k$) si se obtine ecuatia patrata

$$t^2 - 6t + 5 = 0$$

cu solutiile $t_1 = 1$ si $t_2 = 5$. Asadar

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = 5, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = \operatorname{arctg} 5 + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Ecuatii omogene

Ecuatia

$$a_0 \sin^n x + a_1 \sin^{n-1} x \cos x + \dots + a_{k-1} \sin x \cos^{n-1} x + a_n \cos^n x = 0, \quad (21)$$

unde $a_0 \cdot a_n \neq 0$, se numeste ecuatie omogena de gradul n in raport cu $\sin x$ si $\cos x$.

Cum $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbf{Z}$ nu verifica ecuatia (21) (toti termenii, incepand cu al doilea sunt nuli, iar primul este diferit de zero) multiplicand ecuatia cu $\frac{1}{\cos^n x}$ ($\neq 0$) se obtine ecuatia echivalenta

$$a_0 \operatorname{tg}^n x + a_1 \operatorname{tg}^{n-1} x + \dots + a_{n-1} \operatorname{tg} x + a_n = 0$$

care prin substitutia $\operatorname{tg} x = t$, se reduce la rezolvarea unei ecuatii algebrice de gradul n .

Exemplul 9. Sa se rezolve ecuatiile

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sin 2x - \cos 2x = 0; & \text{c) } 5 \sin^2 x + 5 \sin x \cos x = 3; \\ \text{b) } \sin^2 x + \sin 2x - 3 \cos^2 x = 0; & \text{d) } \cos 2x + \sin 2x = \sqrt{2}. \end{array}$$

Rezolvare. a) Ecuatia a) reprezinta o ecuatie trigonometrica omogena de gradul intai. Se multiplica cu $\frac{1}{\cos 2x}$ si se obtine ecuatia liniara in raport cu $\operatorname{tg} 2x$

$$\operatorname{tg} 2x - 1 = 0$$

de unde $\operatorname{tg} 2x = 1$ si $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}n$, $n \in \mathbf{Z}$.

b) Cum $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ecuatia b) se scrie $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x = 0$ si reprezinta o ecuatie trigonometrica omogena de gradul al doilea. Se multiplica cu $\frac{1}{\cos^2 x}$ si se obtine ecuatia patrata

$$\operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$$

cu solutiile $\operatorname{tg} x = -3$ si $\operatorname{tg} x = 1$. Prin urmare

$$\begin{cases} x = -\operatorname{arctg} 3 + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

c) Se scrie $3 = 3 \cdot 1 = 3 \cdot (\sin^2 x + \cos^2 x)$ si ecuatia devine

$$5 \sin^2 x + 5 \sin x \cdot \cos x = 3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x$$

sau

$$2 \sin^2 x + 5 \sin x \cdot \cos x - 3 \cos^2 x = 0$$

adica o ecuatie trigonometrica omogena de gradul al doilea. Se rezolva similar exemplelor precedente si se obtin solutiile $x = -\operatorname{arctg} 3 + \pi k$, $k \in \mathbf{Z}$ si $x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

d) Cum $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\sqrt{2} = \sqrt{2}(\sin^2 x + \cos^2 x)$, ecuatia devine

$$\cos^2 x - \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = \sqrt{2} \sin^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x$$

sau

$$(\sqrt{2} + 1) \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + (\sqrt{2} - 1) \cos^2 x = 0,$$

adica este o ecuatie trigonometrica omogena de gradul al doilea. Se multiplica cu $\frac{1}{\cos^2 x}$ si se obtine ecuatia patrata

$$(\sqrt{2} + 1) \operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x + \sqrt{2} - 1 = 0$$

cu solutia $\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$ sau, rationalizand numitorul, $\operatorname{tg} x = \sqrt{2} - 1$.

Asadar, $x = \operatorname{arctg}(\sqrt{2} - 1) + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

Metoda transformarii sumei functiilor trigonometrice in produs

Ecuatiile de forma

$$\sin \alpha(x) \pm \sin \beta(x) = 0 \tag{22}$$

$$\cos \alpha(x) \pm \cos \beta(x) = 0 \tag{23}$$

cu ajutorul formulelor transformarii sumei in produs

$$\sin \alpha(x) \pm \sin \beta(x) = 2 \sin \frac{\alpha(x) \pm \beta(x)}{2} \cos \frac{\alpha(x) \mp \beta(x)}{2} \tag{24}$$

$$\cos \alpha(x) + \cos \beta(x) = 2 \cos \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{2} \cos \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{2} \tag{25}$$

$$\cos \alpha(x) - \cos \beta(x) = -2 \sin \frac{\alpha(x) - \beta(x)}{2} \sin \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{2} \tag{26}$$

se reduc la ecuatii trigonometrice simple.

Exemplul 10. Sa se rezolve ecuatiile

a) $\sin 3x + \sin x = 0$; c) $\cos 5x = \sin 3x$;

b) $\cos x + \cos 3x = 0$; d) $\sin x + \cos 2x + \sin 3x + \cos 4x = 0$.

Rezolvare. a) $\sin 3x + \sin x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos x = 0, \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbf{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbf{Z} \quad (\text{se observa ca solutiile } x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbf{Z})$$

se contin in solutiile $x = \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbf{Z}$ - a se desena cercul trigonometric si a se depune pe el solutiile obtinute).

b) $\cos x + \cos 3x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 2x \cos(-x) = 0$. Cum functia cosinus este o functie para, se obtine totalitatea

$$\begin{cases} \cos 2x = 0, \\ \cos x = 0, \end{cases}$$

de unde $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k$, $k \in \mathbf{Z}$, $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$.

c) Cum $\cos 5x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 5x\right)$ (formulele de reducere) se obtine ecuatia

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - 5x\right) - \sin 3x = 0$$

sau

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - 4x\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 0,$$

de unde, tinand seama ca functia sinus este impara, iar functia cosinus este para, se obtine totalitatea

$$\begin{cases} \sin\left(4x - \frac{\pi}{4}\right) = 0, \\ \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0, \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} 4x - \frac{\pi}{4} = \pi k, \\ x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{4}k, k \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{3\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

d) Se grupeaza convenabil: $(\sin x + \sin 3x) + (\cos 2x + \cos 4x) = 0$, se aplica formulele (24) si (25) si se obtine ecuatia

$$2 \sin 2x \cos x + 2 \cos 3x \cos x = 0$$

sau

$$2 \cos x(\sin 2x + \cos 3x) = 0,$$

de unde rezulta totalitatea de ecuatii

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin 2x + \cos 3x = 0. \end{cases}$$

Din prima ecuatie se obtine $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbf{Z}$. Ecuatia secunda a totalitatii se rezolva similar exemplului c) si se obtine $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, $m \in \mathbf{Z}$ (se contine in solutia deja obtinuta) si $x = \frac{3\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$, $k \in \mathbf{Z}$. Asadar solutiile ecuatiei initiale sunt $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $x = \frac{3\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$, $n, k \in \mathbf{Z}$.

Metoda transformarii produsului in suma
(utilizarea formulelor $\sin(\alpha \pm \beta)$, $\cos(\alpha \pm \beta)$).

Exemplul 11. Sa se rezolve ecuatiile

$$a) \cos x \cos 2x - \sin x \sin 2x = 1; \quad b) \cos x \cos 3x = \cos 4x.$$

Rezolvare. a) $\cos x \cos 2x - \sin x \sin 2x = 1 \Leftrightarrow \cos(x + 2x) = 1 \Leftrightarrow \cos 3x = 1 \Leftrightarrow 3x = 2\pi k, k \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}k, k \in \mathbf{Z}.$

b) Cum $\cos x \cos 3x = \frac{1}{2}[\cos(x + 3x) + \cos(x - 3x)] = \frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 2x)$ se obtine

$$\frac{1}{2} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x = \cos 4x,$$

sau $\cos 2x - \cos 4x = 0$, de unde rezulta

$$2 \sin(-x) \sin 3x = 0.$$

Ultima ecuatie este echivalenta cu totalitatea

$$\begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin 3x = 0, \end{cases}$$

de unde $x = \frac{\pi k}{3}, k \in \mathbf{Z}$ (solutiile primei ecuatiei se contin in solutiile ecuatiei secunde).

Metoda micșorării puterii

Aceasta metoda utilizeaza formulele

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad (27)$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad (28)$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x, \quad (29)$$

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x, \quad (30)$$

$$\sin^8 x + \cos^8 x = \cos^2 2x + \frac{1}{8} \sin^4 2x, \quad (31)$$

in scopul micșorării gradului ecuatiei ce urmeaza a fi rezolvate. Formulele (27) si (28) se utilizeaza si la rezolvarea ecuatiilor

$$\sin^2 ax + \sin^2 bx = \sin^2 cx + \sin^2 dx, \quad (32)$$

$$\cos^2 ax + \cos^2 bx = \cos^2 cx + \cos^2 dx, \quad (33)$$

daca numerele a, b, c si d verifica una din conditiile $a + b = c + d$ sau $a - b = c - d$.

Exemplul 12. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x = \frac{3}{2};$$

$$\text{b) } \sin^4 2x + \cos^4 2x = \sin 2x \cos 2x;$$

$$\text{c) } \cos^6 x + \sin^6 x = \cos 2x.$$

Rezolvare. a) Se utilizeaza formula (27) si se obtine ecuatiile echivalente

$$\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} = \frac{3}{2}$$

sau

$$\cos 2x + \cos 4x + \cos 6x = 0.$$

Se grupeaza convenabil si se obtine

$$(\cos 2x + \cos 6x) + \cos 4x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos 4x \cos 2x + \cos 4x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos 4x(2 \cos 2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 4x = 0, \\ \cos 2x = -\frac{1}{2}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4}n, & n \in \mathbf{Z}, \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, & k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

b) Cum (a se vedea (29)) $\sin^4 2x + \cos^4 2x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 4x$, iar $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$, ecuatiile devin

$$1 - \frac{1}{2} \sin^2 4x = \frac{1}{2} \sin 4x$$

sau $\sin^4 2x + \sin 4x - 2 = 0$, de unde rezulta $\sin 4x = 1$ si $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}n$, $n \in \mathbf{Z}$.

c) Cum $\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4}(1 - \cos^2 2x) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cos^2 2x$, ecuatiile devin

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cos^2 2x - \cos 2x = 0 \text{ sau } 3 \cos^2 2x - 4 \cos 2x + 1 = 0,$$

de unde rezulta totalitatea

$$\begin{cases} \cos 2x = 1, \\ \cos 2x = \frac{1}{3}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi n, & n \in \mathbf{Z}, \\ x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3} + \pi k, & k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Ecuatii de tipul

$$a \sin x + b \cos x = c, \quad a \cdot b \cdot c \neq 0. \tag{34}$$

Se propun urmatoarele metode de rezolvare a ecuatiilor de forma (34):

a) Reducerea la o ecuatie omogena de gradul al doilea in raport cu $\sin \frac{x}{2}$ si $\cos \frac{x}{2}$.

Se scrie

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin 2\frac{x}{2} = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}, \\ \cos x &= \cos 2\frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}, \\ c &= c \cdot 1 = c \cdot \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right)\end{aligned}$$

si ecuatiia (34) devine

$$(b+c) \sin^2 \frac{x}{2} - 2a \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + (c-b) \cos^2 \frac{x}{2} = 0,$$

- omogena de gradul 2 daca $(c-b)(b+c) \neq 0$, sau, in caz contrar, se reduce la rezolvarea unei ecuatii omogene de gradul 1 si a unei ecuatii de tipul (2) sau (5).

Exemplul 13. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \sin 2x + \cos 2x = 1; \quad \text{b) } \sin x + \cos x = \sqrt{2}.$$

Rezolvare. a) $\sin 2x + \cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x + \cos^2 x - \sin^2 x = \sin^2 x + \cos^2 x \Leftrightarrow$
 $2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin x (\cos x - \sin x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0, \\ \cos x - \sin x = 0, \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

b) $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \sqrt{2} \sin^2 \frac{x}{2} + \sqrt{2} \cos^2 \frac{x}{2} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\sqrt{2}+1) \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + (\sqrt{2}-1) \cos^2 \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{2}+1) \operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x + \sqrt{2}-1 = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{2}-1 \Leftrightarrow x = \operatorname{arctg}(\sqrt{2}-1) + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}.$

b) Utilizarea formulelor

$$\sin \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}, \quad \cos \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}} \quad (\alpha \neq \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z}). \quad (35)$$

Cu ajutorul formulelor indicate, ecuatiia (34) se reduce la o ecuatie patrata in raport cu $\operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Se tine seama ca aplicarea acestor formule aduce la pierderea solutiilor $\alpha = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbf{Z}$, din ce cauza se verifica (prin substituirea directa in ecuatiia initiala), daca ele sunt sau ba solutii ale ecuatiei (34).

Exemplul 14. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \sin 2x + \cos 2x = 1; \quad \text{b) } \sqrt{3} \sin x + \cos x = -1.$$

Rezolvare. a) Cum $\sin 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$, $\cos 2x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$, $\left(x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbf{Z}\right)$ si cum $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$ nu verifica ecuatia data, ecuatia este echivalenta cu ecuatia

$$\frac{2 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = 1 \quad \text{sau} \quad 1 + \operatorname{tg}^2 x = 2 \operatorname{tg} x + 1 - \operatorname{tg}^2 x,$$

de unde rezulta

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

b) Se aplica formulele (35) si se obtine

$$\begin{cases} \frac{2\sqrt{3} \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = -1, \\ x \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}, \end{cases}$$

sau

$$\begin{cases} 2\sqrt{3} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} = 1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}, \\ x \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}, \end{cases}$$

de unde $\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \\ x \neq \pi + 2\pi k, \end{cases}$ si $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$. Verificarea directa arata ca si $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}$ sunt solutii ale ecuatiei date. Asadar solutiile ecuatiei date sunt $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, x = \pi + 2\pi n, k, n \in \mathbf{Z}$.

c) Metoda unghiului auxiliar.

Cum $a \cdot b \cdot c \neq 0$ ecuatia (34) se scrie

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (36)$$

si cum $\left| \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \leq 1, \left| \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \leq 1$ si $\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1$ rezulta ca exista un unghi α , astfel incat

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{si} \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (37)$$

sau un unghi β , astfel incat

$$\sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{si} \quad \cos \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad (38)$$

Atunci ecuatia (36) se scrie

$$\sin(x + \alpha) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

sau

$$\cos(x - \beta) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Ultimile ecuatii nu prezinta greutati in rezolvare.

Nota. Se observa ca ecuatia (34) are solutii daca si numai daca $\left| \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \leq 1$, iar valoarea maxima a functiei $f(x) = a \sin x + b \cos x$ este $\sqrt{a^2 + b^2}$ si valoarea minima este $-\sqrt{a^2 + b^2}$.

Exemplul 15. Sa se rezolve ecuatiile

$$\text{a) } \sin 2x + \cos 2x = 1; \quad \text{b) } 3 \sin x + 4 \cos x = 5; \quad \text{c) } \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{3}.$$

Rezolvare. a) $\sin 2x + \cos 2x = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \cos 2x \cos \frac{\pi}{4} + \sin 2x \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbf{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbf{Z}. \end{cases}$

b) $3 \sin x + 4 \cos x = 5 \Leftrightarrow \frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \cos \alpha + \cos x \sin \alpha = 1, \\ \sin \alpha = \frac{4}{5}; \cos \alpha = \frac{3}{5}, \end{cases} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x + \alpha) = 1, \\ \operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{3}, \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - \operatorname{arctg} \frac{4}{3}, k \in \mathbf{Z}.$

c) Cum valoarea maxima a membrului din stanga ecuatiei este $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ si $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ rezulta ca ecuatia nu are solutii.

Ecuatii de tipul $F(\sin x \pm \cos x, \sin x \cos x) = 0$.

Ecuatiile de asa tip se rezolva cu ajutorul substitutiei $t = \sin x \pm \cos x$, $|t| \leq \sqrt{2}$.

Exemplul 16. Sa se rezolve ecuatiile:

$$\text{a) } 2(\sin x + \cos x) + \sin 2x + 1 = 0;$$

$$\text{b) } 1 - \sin 2x = \cos x - \sin x;$$

$$\text{c) } \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\sin x \cos x} = 5.$$

Rezolvare. a) Se noteaza $t = \sin x + \cos x$, atunci $t^2 = (\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$, si ecuatia devine $2t + t^2 = 0$, de unde $t = 0$ sau $t = -2$. Cum ecuatia $\sin x + \cos x = -2$ nu are solutii, ramane $\sin x + \cos x = 0$ - ecuatie omogena de gradul intai cu solutiile $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbf{Z}$.

b) Se noteaza $\cos x - \sin x = t$, atunci $\sin 2x = 1 - t^2$ si ecuatia devine $t^2 = t$ cu solutiile $t = 0$, $t = 1$. Asadar

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \cos x - \sin x = 0, \\ \cos x - \sin x = 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \operatorname{tg} x = 0, \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad m \in \mathbf{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

c) DVA al ecuatiei este $\mathbf{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \cdot n, n \in \mathbf{Z} \right\}$. In DVA ecuatia se scrie

$$\sin x + \cos x - 5 \sin x \cos x + 1 = 0.$$

Se noteaza $t = \sin x + \cos x$ si se obtine ecuatia patrata

$$5t^2 - 2t - 7 = 0,$$

cu solutiile $t = -1$ si $t = \frac{7}{5}$. Prin urmare $\sin x + \cos x = -1$, de unde $x = \frac{\pi}{4} \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbf{Z}$ (nu verifica DVA al ecuatiei) $\sin x + \cos x = \frac{7}{5}$, de unde $x = \frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{7}{5\sqrt{2}} + 2\pi k$, $k \in \mathbf{Z}$.

Metoda descompunerii in factori

Aceasta metoda este una din cele mai frecvente si presupune o cunoastere satisfacatoare a *formulelor trigonometrice*.

Exemplul 17. Sa se rezolve ecuatiile

- $\sin^3 x - \cos^3 x = \cos 2x$;
- $\sin 3x - \sin 2x + 2 \cos x = 2 \cos^2 x - \sin x$;
- $4 \sin x + 2 \cos x = 2 + 3 \operatorname{tg} x$.

Rezolvare. a) $\sin^3 x - \cos^3 x = \cos 2x \Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x) =$

$$\begin{aligned}
&= \cos^2 x - \sin^2 x \Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(1 + \sin x \cos x + (\cos x + \sin x)) = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \cos x = 0, \\ 1 + \sin x \cos x + (\cos x + \sin x) = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \begin{cases} 1 + \frac{t^2 - 1}{2} + t = 0, \\ t = \sin x + \cos x, \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ \begin{cases} t^2 + 2t + 1 = 0, \\ t = \sin x + \cos x, \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ \sin x + \cos x = -1, \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ x = \pi + 2\pi m, \quad m \in \mathbf{Z}. \end{cases}
\end{aligned}$$

b) Se trec toti termenii in stanga ecuatiei si se grupeaza convenabil:

$$(\sin 3x + \sin x) + 2 \cos x - (\sin 2x + 2 \cos^2 x) = 0.$$

Se utilizeaza formulele sumei sinusurilor si sinusului unghiului dublu si se obtine

$$(2 \sin 2x \cos x + 2 \cos x) - (2 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x) = 0$$

sau

$$2 \cos x \cdot [(\sin 2x + 1) - (\sin x + \cos x)] = 0.$$

Se tine seama ca $\sin 2x + 1 = 2 \sin x \cos x + \sin^2 x + \cos^2 x = (\sin x + \cos x)^2$ si ecuatia devine

$$2 \cos x [(\sin x + \cos x)^2 - (\sin x + \cos x)] = 0$$

sau

$$2 \cos x (\sin x + \cos x) (\sin x + \cos x - 1) = 0,$$

de unde se obtine totalitatea

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x + \cos x = 0, \\ \sin x + \cos x - 1 = 0. \end{cases}$$

Din prima ecuatie a totalitatii se obtine $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbf{Z}$. Cea secunda reprezinta o ecuatie trigonometrica omogena de gradul intai cu solutiile $x = -\frac{\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbf{Z}$. Ecuatia a treia se rezolva, de exemplu, prin metoda introducerii unghiului auxiliar si are solutiile $x = 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$

si $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi l$, $l \in \mathbf{Z}$. Ultimul set de solutii se contine in multimea solutiilor primei ecuatiei si prin urmare multimea solutiilor ecuatiei initiale este

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi m, \quad x = 2\pi n, \quad k, m, n \in \mathbf{Z}.$$

c) DVA al ecuatiei este $\mathbf{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbf{Z} \right\}$ ($\cos x \neq 0$). Ecuatia se scrie

$$4 \sin x + 2 \cos x = 2 + 3 \frac{\sin x}{\cos x}$$

sau

$$4 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x - 2 \cos x - 3 \sin x = 0.$$

Se grupeaza convenabil:

$$2 \cos x(2 \sin x - 1) + (2 \cos^2 x - 3 \sin x) = 0,$$

sau, cum $2 \cos^2 x = 2(1 - \sin^2 x) = 2 - 2 \sin^2 x$,

$$2 \cos x(2 \sin x - 1) + (2 - 3 \sin x - 2 \sin^2 x) = 0.$$

Cum $2 - 3 \sin x - 2 \sin^2 x = 2 - 4 \sin x + \sin x - 2 \sin^2 x = 2(1 - 2 \sin x) + \sin x(1 - 2 \sin x) = (1 - 2 \sin x)(2 + \sin x)$, ecuatia devine

$$2 \cos x(2 \sin x - 1) + (1 - 2 \sin x)(2 + \sin x) = 0,$$

sau

$$(2 \sin x - 1)(2 \cos x - \sin x - 2) = 0.$$

Cum $2 \cos x - \sin x - 2 = 2(\cos x - 1) - \sin x = 2 \cdot \left(-2 \sin^2 \frac{x}{2}\right) - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = -2 \sin \frac{x}{2} \left(2 \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right)$, ecuatia se scrie

$$-2(2 \sin x - 1) \sin \frac{x}{2} \left(2 \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right) = 0.$$

de unde rezulta

$$\sin x = \frac{1}{2}, \quad \text{cu solutiile } x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbf{Z},$$

$$\sin \frac{x}{2} = 0, \quad \text{cu solutiile } x = 2\pi m, \quad m \in \mathbf{Z},$$

$$2 \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} = 0, \quad \text{cu solutiile } x = -2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z}.$$

Toate solutiile obtinute verifica DVA al ecuatiei.

In incheiere vom prezenta unele metode utile de rezolvare a ecuatiilor trigonometrice.

Exemplul 18. Sa se rezolve ecuatiile:

- a) $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \dots + \cos nx = n, \quad n \in \mathbf{N}, \quad n \geq 1;$
 b) $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots + \sin nx = n, \quad n \in \mathbf{N}, \quad n \geq 2;$
 c) $\sin^{11} x + \cos^{11} x = 1;$
 d) $\sin^{10} x - \cos^7 x = 1;$
 e) $\sin \frac{x}{2} \cos 2x = -1;$
 f) $3 \sin 2x + 4 \cos 6x \cos 2x + 2 \sin 10x = 7;$
 g) $\sin 2x \left(\cos \frac{x}{2} - 2 \sin 2x \right) + \cos 2x \left(1 + \sin \frac{x}{2} - 2 \cos 2x \right) = 0;$
 h) $4 \sin^2 x - 4 \sin^2 3x \sin x + \sin^2 3x = 0;$
 i) $\sqrt{\frac{1}{16} + \cos^4 x - \frac{1}{2} \cos^2 x} + \sqrt{\frac{9}{16} + \cos^4 x - \frac{3}{2} \cos^2 x} = \frac{1}{2};$
 j) $\cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \frac{1}{16}.$

Rezolvare. a) Cum pentru orice m natural $|\cos mx| \leq 1$, membrul din stanga ecuatiei va fi egal cu n daca si numai daca fiecare termen va fi egal cu unu. Asadar rezulta sistemul

$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ \cos 2x = 1, \\ \dots \\ \cos nx = 1 \end{cases}$$

cu solutiile $x = 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z}.$

b) Se rezolva similar exemplului a) si se obtine sistemul

$$\begin{cases} \sin x = 1, \\ \sin 2x = 1, \\ \dots \\ \sin nx = 1, \end{cases}$$

care este incompatibil. Intr-adevar, solutiile primei ecuatiei: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}$ nu verifica a doua ecuatie a sistemului: $\sin 2 \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) = \sin(\pi + 4\pi n) = 0 \neq 1.$ Prin urmare ecuatia nu are solutii.

c) Cum $\sin^{11} x \leq \sin^2 x, \quad \cos^{11} x \leq \cos^2 x$ implica $\sin^{11} x + \cos^{11} x \leq \sin^2 x + \cos^2 x$, sau $\sin^{11} x + \cos^{11} x \leq 1$, iar in ultima inegalitate semnul egalitatii se atinge daca si numai daca

$$\left[\begin{cases} \sin x = 0, \\ \cos x = 1, \\ \sin x = 1, \\ \cos x = 0. \end{cases} \right.$$

rezulta ca ecuatia are solutiile $x = 2\pi m$, $m \in \mathbf{Z}$ (din primul sistem al totalitatii) si $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbf{Z}$ (din sistemul secund).

d) Se utilizeaza acelasi procedeu ca si in exemplul precedent: $\sin^{10} x \leq \sin^2 x$, $-\cos^7 x \leq \cos^2 x$, de unde $\sin^{10} x - \cos^7 x \leq 1$ si, prin urmare, semnul egalitatii se atinge cand

$$\begin{cases} \sin^{10} x = \sin^2 x, \\ -\cos^7 x = \cos^2 x, \end{cases}$$

adica $\sin x \in \{0; -1; 1\}$, iar $\cos x \in \{0; -1\}$. Asadar se obtine $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$; $x = \pi + 2\pi m$, $n, m \in \mathbf{Z}$.

e) Cum $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \leq 1$, $|\cos 2x| \leq 1$, membrul din stanga ecuatiei va fi egal cu minus unu, daca si numai daca

$$\left[\begin{cases} \sin \frac{x}{2} = 1, \\ \cos 2x = -1, \\ \sin \frac{x}{2} = -1, \\ \cos 2x = 1. \end{cases} \right.$$

Din $\sin \frac{x}{2} = 1$, rezulta $x = \pi + 4\pi n$ si atunci $\cos 2x = \cos(2\pi + 8\pi n) = 1 \neq -1$, adica primul sistem al totalitatii este incompatibil. Din $\sin \frac{x}{2} = -1$ rezulta $x = -\pi + 4\pi k$ si atunci $\cos 2(-\pi + 4\pi k) = \cos 2\pi = 1$, deci $x = -\pi + 4\pi k$, $k \in \mathbf{Z}$ sunt solutiile sistemului (si ecuatiei enuntate).

f) Cum $3 \sin 2x + 4 \cos 6x \cos 2x \leq 3 \sin 2x + 4 \cos 2x \leq 5$ (a se vedea nota la Metoda unghiului auxiliar), $2 \sin 10x \leq 2$ se obtine $3 \sin 2x + 4 \cos 6x \cos 2x + 2 \sin 10x \leq 7$, si semnul egalitatii se atinge doar pentru

$$\begin{cases} |\cos 6x| = 1, \\ \sin 10x = 1, \end{cases} \quad \text{sau} \quad \begin{cases} \sin 6x = 0, \\ \sin 10x = 1, \end{cases}$$

de unde

$$\begin{cases} x = \frac{\pi n}{6}, \quad n \in \mathbf{Z}, \\ x = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi m}{10}, \quad m \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Ultimul sistem este incompatibil. In adevar

$$\frac{\pi n}{6} = \frac{\pi}{20} + \frac{\pi m}{10}, \quad n, m \in \mathbf{Z}$$

conduce la ecuatia in numere intregi

$$10n = 3 + 6m \quad \text{sau} \quad 10n - 6m = 3$$

care nu are solutii: diferenta a doua numere pare nu este un numar impar. Prin urmare ecuatia enuntata nu are solutii.

g) Ecuația se scrie

$$\sin\left(2x + \frac{x}{2}\right) - 2(\sin^2 2x + \cos^2 2x) + \cos 2x = 0$$

sau

$$\sin \frac{5x}{2} + \cos 2x = 2.$$

Membrul din stanga nu intrece doi ($\sin \frac{5x}{2} \leq 1$, $\cos 2x \leq 1$), prin urmare ecuația are solutii daca si numai daca

$$\begin{cases} \sin \frac{5x}{2} = 1, \\ \cos 2x = 1, \end{cases} \text{ sau } \begin{cases} x = \frac{\pi}{5} + \frac{4\pi k}{5}, k \in \mathbf{Z} \\ x = \pi n, n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

Sistemul obtinut (si deci si ecuația initiala) are solutii daca vor exista asa $n, k \in \mathbf{Z}$ astfel incat

$$\frac{\pi}{5} + \frac{4\pi k}{5} = \pi n,$$

sau

$$1 + 4k = 5n$$

de unde $4k = 5n - 1$ sau $4k = 4n + (n - 1)$. Asadar, $n - 1$ urmeaza a fi divizibil prin 4, adica

$$n - 1 = 4s, s \in \mathbf{Z}$$

de unde $n = 4s + 1$ si cum $1 + 4k = 5n$, adica $4k = 5(4s + 1) - 1$ se obtine $k = 5s + 1$, si

$$x = \pi + 4\pi s, s \in \mathbf{Z}.$$

h) Membrul din stanga ecuației se considera trinom patrat in raport cu $\sin x$. Discriminantul acestui trinom este

$$D = 16 \sin^4 3x - 16 \sin^2 3x,$$

de unde rezulta ca ecuația enuntata va avea solutii doar pentru $\sin^2 3x \leq 0$ sau $\sin^2 3x \geq 1$. Prin urmare (cum $\sin^2 \alpha \geq 0$ si $\sin^2 \beta \leq 1$) ecuația poate avea solutii doar daca $\sin^2 3x = 0$ sau $\sin^2 3x = 1$ adica $x = \frac{\pi n}{3}$ respectiv $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m$, $n, m \in \mathbf{Z}$.

Se substituie in ecuație si se obtine

- $4 \sin^2 \frac{\pi}{3} \cdot n - 4 \sin^2 \pi n \cdot \sin \frac{\pi}{3} n + \sin^2 \pi n = 0$. Cum $\sin^2 \pi n = 0$, ramane $4 \sin^2 \frac{\pi}{3} n = 0$, de unde $n = 3m$, $m \in \mathbf{Z}$, adica din primul set se obtine solutiile $x = \pi m$, $m \in \mathbf{Z}$.

- $4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m\right) - 4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \pi m\right) \sin \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m\right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \pi m\right) = 0$.

Cum $\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \pi m\right) = \cos^2 \pi m = 1$, se obtine

$$4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m\right) - 4 \sin \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m\right) + 1 = 0$$

adica

$$\left(2 \sin \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}m\right) - 1\right)^2 = 0,$$

de unde rezulta $x = \frac{\pi}{6} + \pi k$ sau $x = \frac{5\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbf{Z}$ adica $x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbf{Z}$.

Asadar solutiile ecuatiei date sunt

$$x = \pi n, n \in \mathbf{Z}, \quad x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbf{Z}.$$

i) Se noteaza $\cos^2 x = t$ si ecuatia devine

$$\frac{\sqrt{16t^2 - 8t + 1}}{4} + \frac{\sqrt{16t^2 - 24t + 9}}{4} = \frac{1}{2}$$

sau

$$\sqrt{(4t - 1)^2} + \sqrt{(4t - 3)^2} = 2,$$

de unde

$$|4t - 1| + |4t - 3| = 2.$$

Se tine seama ca $|4t - 3| = |3 - 4t|$ si $2 = |2| = |4t - 1 + 3 - 4t|$ si utilizand proprietatile modulului se obtine inecuatia

$$(4t - 1)(3 - 4t) \geq 0,$$

de unde

$$\frac{1}{4} \leq t \leq \frac{3}{4},$$

adica $\frac{1}{4} \leq \cos^2 x \leq \frac{3}{4}$ sau $\frac{1}{2} \leq |\cos x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Din ultima inecuatie se obtine (a se vedea tema Inecuatiilor trigonometrice) solutiile ecuatiei enuntate

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k \right\} \cup \left\{ \pi k - \frac{\pi}{3}; \pi k - \frac{\pi}{6} \right\}, k \in \mathbf{Z}.$$

j) Cum $x = \pi k, k \in \mathbf{Z}$ nu sunt solutiile ale ecuatiei date ($\cos \pi k = \pm 1, \cos 2\pi k = \cos 4\pi k = \cos 8\pi k = 1$) se multiplica ambii membri ai ecuatiei cu $16 \sin x$ si se utilizeaza formula sinusului unghiului dublu

$$16 \sin x \cos x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \sin x,$$

$$8 \sin 2x \cos 2x \cos 4x \cos 8x = \sin x,$$

$$4 \sin 4x \cos 4x \cos 8x = \sin x,$$

$$2 \sin 8x \cos 8x = \sin x,$$

$$\sin 16x = \sin x,$$

sau $\sin 16x - \sin x = 0, 2 \sin \frac{15x}{2} \cos \frac{17x}{2} = 0$, de unde $\sin \frac{15x}{2} = 0, x = \frac{2\pi k}{15}, k \in \mathbf{Z}, k \neq 15s, s \in \mathbf{Z}$ (deoarece $x \neq \pi m$) si $\cos \frac{17x}{2} = 0, x = \frac{\pi}{17} + \frac{2\pi m}{17}, m \in \mathbf{Z}, m \neq 17s + 8, s \in \mathbf{Z}$.

Exercitii pentru autoevaluare

Sa se rezolve ecuatiile

1. $2 \sin^2 x - 1 = \cos x;$

2. $7 \operatorname{tg} x - 4 \operatorname{ctg} x = 12$;
3. $\operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x + 2 = 0$;
4. $6 \cos^2 x + 5 \cos x + 1 = 0$;
5. $\sin^2 x - \cos^2 x = \cos x$;
6. $3 \cos^2 x + 4 \sin x \cos x + 5 \sin^2 x = 2$;
7. $3 \cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x = 0$;
8. $\cos 2x \cos x = \sin 7x \sin 6x + 8 \cos \frac{3\pi}{2}$;
9. $\cos 3x \cos 6x = \cos 5x \cos 8x$;
10. $\sin^2 x + \sin^2 2x = \sin^2 3x + \sin^2 4x$;
11. $\frac{1}{2}(\sin^4 x + \cos^4 x) = \sin^2 x \cos^2 x + \sin x \cos x - \frac{1}{2}$;
12. $\cos 3x = \cos x$;
13. $\sin 2x = \sin x$;
14. $\sin 5x = \cos 13x$;
15. $\cos^2 x + 3|\cos x| - 4 = 0$;
16. $8 \sin^2 x \cos^2 x + 4 \sin 2x - 1 = (\sin x + \cos x)^2$;
17. $\sin 3x + \sin x = \sqrt{2} \cos x$;
18. $8 \cos^4 x = 3 + 5 \cos^4 x$;
19. $2\sqrt{3} \sin 2x(3 + \cos 4x) = 7 \sin 4x$;
20. $2 \sin 4x - 3 \sin^2 2x = 1$;
21. $\cos^2 x + \cos^2 \frac{3x}{4} + \cos^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{4} = 2$;
22. $6 \cos^2 x + \cos 3x = \cos x$;
23. $\sin 2x + \cos 2x + \sin x + \cos x + 1 = 0$;
24. $\operatorname{tg} 2x = 4 \cos^2 x - \operatorname{ctg} x$;
25. $\sqrt{1 + \sin 2x} - \sqrt{2} \cos 3x = 0$.